

誤飲

誤飲



ボタン電池は
とりだして
誤飲が
6割り



誤飲

靴を脱いで床や畳で生活し、子どもの手の届くところに物が置かれる事が多い日本は、家庭用品の誤飲事故が米国の3~4倍と言われています。

生後5ヶ月を過ぎると誤飲の事故が増え、特に6ヶ月から2歳までの男児に多く、4割は誤飲現場を目撃されていません。

「さっきまであったはずの物が無い」場合に、誤飲を疑うことは事故を見逃さないために大事なことです。口から飲んでだけでなく、鼻や耳に入れていることも…。

誤飲で多いものは1位 たばこ・2位 医薬品・3位 プラスチック製品やおもちゃです。



ふだん小さな子と生活してないお父さんでは気づけるコッパを伝えておくGood!!

誤飲受診時 伝えてください

- 1 誤飲した物
- 2 個数
- 3 場所
- 4 時間
- 5 応急処置の有無
- 6 応急処置の内容
- 7 嘔吐や腹痛などの症状はないか

受診したときに病院で伝えてください。同じものがあれば持参してください。

予防のポイント

通る危険

- 1 誤飲するサイズ (39mm 以下)
- 2 小さな生活用品は手の届かない高さに (1m 以上)
- 3 小さなおもちゃは 6歳以上で
- 4 ピーナッツなどの豆類は 6歳以上で
- 5 大きな食品は小さく刻む
- 6 異物を口に入れているのを発見したときは大声を出さない

異物を口に入れているのを発見したときは、発見者が大声を出して慌てたり叱ってしまうと子どもがびっくりしたり泣き出して飲み込んでしまうことがあるので、慌てず優しく口から出させる。



誤飲での受診の際は基本的に

吐かせないで

同じものがあれば持参してください。



3~15歳までの
子どもの口の大きさ
最大直径39mm

この丸よりも小さな物は乳幼児でも誤飲します。成人の親指と人差し指で作った輪やトイレトイレットペーパーの芯を目安にしてください。

誤嚥・誤飲対処早見表

緊急度

飲んだもの・状態

救急車



119

- ☐ 苦しそうな呼吸
- ☐ 窒息、顔色が蒼白い
- ☐ けいれん
- ☐ ぐったりして呼びかけてもぼんやり



119番



- 灯油 ● ベンジン ● 除光液
- 農薬 ● 殺虫剤 ● ネズミ駆除剤



- ☐ 突然の咳き込み、咳の出現
- ☐ 声がかすれている
- ☐ ゼーゼー・ヒューヒューした呼吸
- ☐ 吐く・下痢・腹痛などの症状

こんな場合も救急車を要請してOK



- ボタン電池 できるだけ総合病院を受診
- 鋭利な異物 ガラス・針・ヘアピン・カッターの刃 など
- 磁石 同じものがあれば持参
- 家庭用化学用品 トイレ用スタンプ洗剤・バック型液体洗剤 吸水性樹脂・水で膨らむビーズ 芳香剤・消臭剤・防虫剤・漂白剤 など
- たばこ 商品名、誤飲した量と内容
- くすり 同じもの・お薬手帳もあれば持参
- コインやおもちゃ等 よく誤飲しやすいもの




自家用車で
急いで受診



診療時間内

- 少量のインク、クレヨン、絵の具、粘土、化粧品 (口紅、ファンデーション)、せっけん 心配な場合は電話などで相談の上受診



症状がなくても受診してください

基本的に **吐かせない** で **同じものがあれば持参** してください。

この薬を
のみました



自家用車で
総合病院

ボタン電池

総合病院をすぐに受診 同じものを持参

ボタン電池の誤飲の6割は何らかの機器から取り出された物。
機器などから取り出されて外に放置してあった物は3割強です。
電池の入っている機器の蓋を子どもが簡単に外せないようにしましょう。
誤飲した場合は、全身麻酔での内視鏡や、場合によっては手術になる
可能性もあるので総合病院を受診してください。

- ☐ 総合病院をすぐに受診
- ☐ 吐かせない
- ☐ 同じ物を持参


- 電池の種類(型番)
- 新品か使用済みか
- 一緒に磁石を誤飲していないか

- 補聴器
- 体温計
- 車のキー
- ペンライト
- ミニゲーム
- キッチンタイマー


こんなものに
注意!



5分後



20分後



120分後



鋭利な異物

すぐに受診 同じものを持参

裁縫針や魚骨など。
鋭利な異物による合併症は他の異物よりも高いです。
腸管に穴を開けたりひっかかったり、
内臓を損傷したりする可能性があります。



磁石

すぐに受診 同じものを持参

磁石は2個以上飲み込むと、磁石に食道・胃・腸の粘膜が挟まれて閉塞したり
穴を開けたりするため取り出す必要があります。
磁石を飲み込んだ子の4割が複数個飲んでたという報告も。
磁石が1個でも他に金属を飲み込んでいれば複数磁石と同じく緊急事態。
永久磁石で最も強いネオジウム磁石による事故の報告もあります。



こんなものに
注意!

- おもちゃの磁石
- 磁石を使った家庭用健康商品



自家用車で
すぐに

家庭用化学製品

すぐに受診 同じものを持参

トイレ用洗浄剤(トイレ用スタンプ洗剤など)、
漂白剤、防虫剤、灯油、マニキュアおよび除光液などは
特に危険。最近はパック型液体洗剤も。

- トイレ用スタンプ洗剤
- パック型液体洗剤



自家用車で
すぐに

たばこ

すぐに受診 同じものを持参

誤飲する異物としては最も多い。
電子たばこのニコチンカートリッジはニコチンが濃縮されており危険。

- 商品名、誤飲した量と内容(新品・吸い殻・灰皿の水)

- 電子タバコも家では吸わない
- ジュースの缶などに吸い殻を入れない
- 手に届く場所に置かない




自家用車で
すぐに

くすり

すぐに受診 同じものを持参

誤飲する異物第2位は医薬品。家族が内服している血圧を下げる薬、
不整脈を抑える薬、血糖を下げる薬、眠剤などに注意。

- お薬手帳もあれば持参



灯油、除光液を飲んだ場合は何も飲ませず、吐かせず
救急車を呼んでください。



困ったときは「中毒110番」 情報提供料：無料

大阪中毒110番
(24時間対応)



072-727-2499

つくば中毒110番
(9時~21時対応)



029-852-9999

タバコ誤飲事故
専用電話
(365日24時間・自動音声)



072-726-9922